

DÁVKOVÁNÍ PRODUKTŮ

ALOE VERA GEL

Stav	Dávka
Základní dávkování	1 ml/kg/denně rozdělit do 2–3 dávek Např. při váze 60 kg – 60 ml denně, rozdělit na 2 x 30 ml.
Pozvolné navyšování dávky (cukrovka, ekzém, staří lidé, hodně diagnóz a léků,...)	1. Týden ¼ ml/kg/denně 2. Týden ½ ml/kg/denně 3. Týden ¾ ml/kg/denně 4. Týden a dále 1 ml/kg denně Denní dávku rozdělit na 2–3 dávky.
Akutní otoky při úrazech (zlomeniny, odřeny, podvrtnutí kloubu), otoky při alergii, lymfedému dolních končetin	1,5–2 ml/kg po dobu 7–14 dnů ve 2–3 denních dávkách
Dlouhodobé virové infekce, únavový syndromu	1–1,5 ml/kg po dobu 3–5 měsíců ve 2–3 denních dávkách
Onkologická onemocnění	2 ml/kg (i více) – na dobu 4–6 měsíců ve 2–3 denních dávkách, po této době lze klesnout na poloviční dávku a podávat do celkové doby 2 let. Nepodávat den před chemoterapií a v den chemoterapie.
Užívat nalačno ¼ hodiny před jídlem nebo hodinu po jídle. Nezapijet horkými tekutinami. Vydatně pít (detoxikace).	

COLOSTRUM

Dospělí

Stav	Colostrum Compact	Colostrum Direct
Prevence	2 x 1 až 3 x 1 cps. denně	2 x 10 až 3 x 10 ml denně
Akutní chřipkové stavy, operace, úrazy,...	2 x 2 až 3 x 2 cps. denně	3 x 10 až 5 x 10 ml denně
Autoimunitní onemocnění, nádorová onemocnění	3 x 2 až 3 x 3 cps. denně	3 x 10 až 5 x 10 ml denně
Nezapijet horkými tekutinami, ale nejlépe čerstvou vodou, u dětí lze kapsli vysypat a přidat do mléka či lžičky smetany.		

Děti

Stav	Colostrum Compact	Colostrum Direct
Prevence respiračních infektů, opakované nemocnosti	1 x 1 cps. vysypat (do 8 let) 2 x 1 cps. (od 8 let)	2 x 1 až 2 x 2 ml (do 1 roku) 2 x 2,5 až 2 x 4 ml (1–3 roky) 2 x 5 až 2 x 8 ml (3–5 let) 2 x 10 ml (5–10 let)
Akutní chřipkové stavy, respirační infekty, operace, úrazy,...	2 x 1 cps. (do 8 let) 3 x 1 až 2 x 2 cps. (nad 8 let)	3 x 1 až 4 x 2 ml (do 1 roku) 3 x 2,5 až 4 x 4 ml (1–3 roky) 3 x 5 až 3 x 8 ml (3–5 let) 3 x 8 až 3 x 10 ml (5–10 let)
Autoimunitní onemocnění, nádorová onemocnění	Konzultovat s lékařem	Konzultovat s lékařem
Nezapijet horkými tekutinami, ale nejlépe čerstvou vodou, pokud je potřeba ovlivnit chuť – nejlépe přidat ke lžičce mléka nebo smetany. Colostrum je vhodné přidat k antibiotiku – zesílí se účinek ATB. Neužívat společně s Aloe Vera gelem.		

MIND MASTER

Stav	Dávkování
Prevence a běžné užívání	80 ml v jedné denní dávce
Závažná onemocnění (nádory, kardiovaskulární choroby)	120 ml denně
Užívat nalačno, nejlépe v dopoledních hodinách.	

DÁVKOVÁNÍ PRODUKTŮ

CISTUS INCANUS

Dospělí

Stav	Cistus incanus kapsle	Cistus incanus Ústní sprej
Prevence respiračních infektů a opakované nemoci	2 x 1 cps. denně	2 x 2 dávky do krku denně
Akutní chřipkové stavy, respirační infekty	3 x 1 až 2 x 2 cps. denně	3 x 3 až 5 x 3 dávky do krku

Děti

Stav	Cistus incanus kapsle	Cistus incanus Ústní sprej
Prevence respiračních infektů a opakované nemoci	1 x 1 cps. (10–14 let) 2 x 1 cps. (od 15 let)	2 x 2 dávky do krku denně (od 8 let)
Akutní chřipkové stavy, respirační infekty	2 x 1 cps. (10–14 let) 3 x 1 cps. (od 15 let)	4 x 2 dávky do krku denně (od 8 let)

SUPER OMEGA 3 ACTIV

Dospělí a děti od 12 let	3 x 1 tobolka denně
Děti od 6 do 12 let	2 x 1 tobolka denně
Děti od 3 let	1 x 1 tobolka denně (konzultace s lékařem)

WOMAN PHYTOACTIV

3 x 1 kapsle denně

PROBIOTIC 12

1 kapsle denně, nejlépe na noc

PROBALANCE

pH menší než 7,0	3 x 4 tablety denně
Po dosažení hodnot pH 6,8-7,4 a ustálení těchto hodnot lze dávkování snížit	3 x 3 až 3 x 2 až 3 x 1 tabletu denně
Užívat s jídlem nebo po jídle.	

REISHI PLUS

Základní dávkování	1 x 1 až 3 x 1 kapsle denně
Závažné stavy (rakovina)	3 x 2 až 3 x 3 kapsle denně
Závažné stavy při kombinaci s Aloe Vera Drinking gelem	3 x 1 až 3 x 2 kapsle denně

VITA ACTIV

Základní dávkování	5 ml denně (1 kávová lžička)
Nádory + riziko vzniku nádorů	10 ml denně